血液内科　悪性リンパ腫

投与間隔　：　7　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）						
				1	2	3	4	5	6	7
リツキシマブ	リツキシマブ	注	375　mg/m^2	○						
	備考									
ポテリジオ	ポテリジオ	注	1　mg/kg	○						
	備考									

投与間隔　：　14　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
R-MPV	リツキシマブ	注	375　mg/m^2	○													
	メソトレキセート	注	3500　mg/m^2		○												
	プロカルバジン	内服	100　mg/m^2		○	○	○	○	○	○	○						
	オンコビン	注	1.4　mg/m^2		○												
	備考	プロカルバジンは奇数コースのみ内服															

投与間隔　：　21　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	プレドニン	内服	60 mg/m^2	朝	○	○	○	○	○																
				昼	○	○	○	○	○																

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

	備考	プレドニン：最大100mg/日、適宜減量あり。 コースごとで血球減少の程度により、リツキシマブ、プレドニン、オンコビン以外の各薬剤を20%増量																													
A+CHP	プレドニン	内服	60 mg/m^2	朝	○	○	○	○	○																						
				昼	○	○	○	○	○																						
	アドセトリス	注	1.8	mg/kg	○																										
	エンドキサン	注	750	mg/m^2	○																										
	ドキソルビシン	注	50	mg/m^2	○																										
	備考	プレドニン：最大100mg/日、適宜減量あり。																													
VR-CAP	プレドニン	内服	60 mg/m^2	朝	○	○	○	○	○																						
				昼	○	○	○	○	○																						
	ベルケイド	注	1.3	mg/m^2	○			○				○			○																
	リツキシマブ	注	375	mg/m^2	○																										
	エンドキサン	注	750	mg/m^2	○																										
	ドキソルビシン	注	50	mg/m^2	○																										
	備考	プレドニン：最大100mg/日、適宜減量あり。																													
アドセトリス	アドセトリス	注	1.8	mg/kg	○																										
	備考																														

投与間隔　：　28　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ABVD	ドキソルビシン	注	25	mg/m2	○														○													
	ブレオ	注	10	mg/m^2	○														○													
	エクザール	注	6	mg/m^2	○														○													
	ダカルバジン	注	375	mg/m^2	○														○													
	備考																															
	アドセトリス	注	1.2	mg/kg	○														○													

| | | |

| | | |