消化器外科　胃癌

投与間隔　：　14　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
mFOLFOX6	オキサリプラチン	注	85	mg/m^2	○													
	レボホリナート	注	200	mg/m^2	○													
	フルオロウラシル（急速）	注	400	mg/m^2	○													
	フルオロウラシル（46時間持続）	注	2400	mg/m^2	○	→	→											
	備考																	
オプジーボ（胃）	オプジーボ	注	240	mg	○													
	備考																	
サイラムザ	サイラムザ	注	8	mg/kg	○													
	備考																	
CPT-11 Biweekly	イリノテカン	注	150	mg/m^2	○													
	備考																	

投与間隔　：　21　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
G－SOX	エスワン	内服	80-120(mg)	朝		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
				夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
	オキサリプラチン	注	100	mg/m^2	○																			

	備考																								
XELOX	カペシタビン	内服	1200−2100(mg)/回	朝		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
				夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
	オキサリプラチン	注	130 mg/m^2		○																				
	備考	カペシタビン：C法、適宜減量																							
ハーセプチン＋Xeloda＋CDDP	ハーセプチン	注	(初回)8 mg/kg (以降)6 mg/kg		○																				
	カペシタビン	内服	1200−2100(mg)/回	朝		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
				夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
	シスプラチン	注	80 mg/m^2		○																				
	備考	カペシタビン：C法、適宜減量																							
ハーセプチン＋XELOX	ハーセプチン	注	(初回)8 mg/kg (以降)6 mg/kg		○																				
	カペシタビン	内服	1200−2100(mg)/回	朝		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
				夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
	オキサリプラチン	注	130 mg/m^2		○																				
	備考	カペシタビン：C法、適宜減量																							
DTX Triweekly	ドセタキセル	注	60 mg/m^2		○																				
	備考																								
TS-1＋DTX	エスワン	内服	80-120(mg)	朝		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
				夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
	ドセタキセル	注	40 mg/m^2		○																				
	備考																								
DOS（患者限定）	エスワン	内服	80-120(mg)	朝		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
				夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
	ドセタキセル	注	40 mg/m^2		○																				
	オキサリプラチン	注	100 mg/m^2		○																				
	備考																								

投与間隔　：　28　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
PTX Weekly	パクリタキセル	注	80　mg/m^2	○							○							○													
	備考																														
サイラムザ+PTX	サイラムザ	注	8　mg/kg	○														○													
	パクリタキセル	注	80　mg/m^2	○							○							○													
	備考																														
サイラムザ +nabPTX	サイラムザ	注	8　mg/kg	○														○													
	アブラキサン	注	100　mg/m^2	○							○							○													
	備考																														
5-FU (持続)	フルオロウラシル	注	800　mg/m^2	○	○	○	○	○																							
	備考																														
nab-PTX Weekly	アブラキサン	注	100　mg/m^2	○							○							○													
	備考																														

投与間隔　：　35　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	・	・	・	34	35
TS-1 +CDDP （TS-1 3投2休）	エスワン	内服	80-120(mg)	朝		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
				夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
	シスプラチン	注	60　mg/m^2									○																				
	備考																															