

血液内科 多発性骨髄腫

投与間隔 : 21 日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール（日）																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BD	ベルケイド	注	1.3	mg/m2	○			○				○			○										
	デキサメタゾン	内服	40	mg	○			○				○			○										
	備考	デキサメタゾンは適宜減量																							
CBD	エンドキサン	注	500	mg/m ²	○							○													
	ベルケイド	注	1.3	mg/m ²	○			○				○			○										
	デキサメタゾン	注	40	mg	○							○							○						
	備考	デキサメタゾンは内服可																							

投与間隔 : 28 日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール（日）																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<u>DRd</u>	ダラザレックス	注	16	mg/kg	○						○							○							○							
	レブラミド	内服	25	mg	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	デキサメタゾン	注	20	mg	○						○							○							○							
		内服*	20	mg		○						○							○							○						
	備考	レブラミドは適宜増減、*デキサメタゾンは静脈内投与可 ダラザレックスは、3-6コース目はday1とday15、7コース目以降はday1に投与																														
<u>ERd</u>	エムプリシディ	注	10	mg/kg	○						○							○							○							
	レブラミド	内服	25	mg	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	デキサメタゾン	注	40	mg	○						○								○						○							

	備考	レブラミドは適宜減量、デキサメタゾンは内服可 エムプリシティは、3コース目以降はday1とday15に投与																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
EPd (1-2コース目)	エムプリシティ	注	10	mg/kg	○								○												○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

