

<u>MEAM</u>	エトポシド	注	200	mg/m ²				○ ○ ○ ○ ○				
	キロサイド	注	200	mg/m ²				○ ○ ○ ○ ○				
	アルケラン	注	140	mg/m ²				○				
	備考											
<u>BUCYE</u>	ブスルフェクス	注	0.8	mg/kg			○ ○ ○					
							○ ○ ○					
							○ ○ ○					
							○ ○ ○					
<u>HD L-PAM</u>	エトポシド	注	200	mg/m ²			○ ○					
	エンドキサン	注	50	mg/kg			○ ○					
	備考											
	アルケラン	注	100	mg/m ²			○ ○					
	備考											

投与間隔 : 未設定

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール (日)										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>short MTX+LV</u>	メソトレキセート	注	10 mg/m ²	○										
			7 mg/m ²		○	○		○						
	ロイコボリン	注	15 mg/m ²	○										
			10 mg/m ²		○			○						

	備考	移植後免疫抑制									
<u>short MTX+LV (day1、3、 6、11)</u>	メソトレキセート	注	10	mg/m ²	○						
			7	mg/m ²		○	○			○	
	ロイコボリン	注	15	mg/m ²	○						
			10	mg/m ²	○		○			○	
	メソトレキセート	注	15	mg/m ²	○						
			10	mg/m ²	○	○	○			○	
	ロイコボリン	注	15	mg/m ²	○						
			10	mg/m ²	○		○			○	
	備考		移植後免疫抑制								



	備考	移植後免疫抑制									
<u>short MTX+LV (原法)</u>	メソトレキセート	注	15	mg/m ²	○						
			10	mg/m ²		○	○				
	ロイコボリン	注	15	mg/m ²	○						
			10	mg/m ²	○		○			○	
	メソトレキセート	注	15	mg/m ²	○						
			10	mg/m ²	○		○			○	
	ロイコボリン	注	15	mg/m ²	○						
			10	mg/m ²	○		○			○	
	備考		移植後免疫抑制								

