

血液内科 多発性骨髄腫

投与間隔 : 21 日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール (日)																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BD	ベルケイド	注	1.3 mg/m ²	○			○					○			○									
	デキサメタゾン	内服	40 mg	○			○					○			○									
	備考	デキサメタゾンは適宜減量																						
CBD	エンドキサン	注	500 mg/m ²	○								○												
	ベルケイド	注	1.3 mg/m ²	○			○					○			○									
	デキサメタゾン	注	40 mg	○								○					○							
	備考	デキサメタゾンは内服可																						

投与間隔 : 28 日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール (日)																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
DRd	ダラザレックス	注	16 mg/kg	○								○						○						○							
	レブラミド	内服	25 mg	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	デキサメタゾン	注	20 mg	○									○						○						○						
		内服*	20 mg		○									○						○						○					
備考	レブラミドは適宜増減、*デキサメタゾンは静脈内投与可 ダラザレックスは、3-6コース目はday1とday15、7コース目以降はday1に投与																														
ERd	エムプリシティ	注	10 mg/kg	○								○						○						○							
	レブラミド	内服	25 mg	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	デキサメタゾン	注	40 mg	○									○						○						○						

