

呼吸器内科 非小細胞肺癌

投与間隔：7 日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール(日)						
					1	2	3	4	5	6	7
<u>PTX+</u> <u>CBDCA(AUC2)</u> <u>+RT</u>	パクリタキセル	注	40	mg/m ²	○						
	カルボプラチン	注	2	AUC	○						
	備考	化学放射線療法、6コース									

投与間隔：14 日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール（日）													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>オブジーボ</u>	オブジーボ	注	240	mg	○													
	備考																	
<u>イミフィンジ</u>	イミフィンジ	注	10	mg/kg	○													
	備考	化学放射線療法後の維持療法、12ヶ月まで																

投与間隔：21 日

[illegible]

	備考	6コースまで、その後維持療法へ									
DTX Triweekly	ドセタキセル	注	60	mg/m ²	○						
	備考										
GEM	ゲムシタビン	注	1000	mg/m ²	○				○		
	備考										
PEM	アリムタ	注	500	mg/m ²	○						
	備考	維持療法としての使用もあり									
PTX +CBDCA (AUC6)	パクリタキセル	注	200	mg/m ²	○						
	カルボプラチン	注	6	AUC	○						
	備考	6コースまで									
PTX +CBDCA RT後 (AUC5)	パクリタキセル	注	200	mg/m ²	○						
	カルボプラチン	注	5	AUC	○						
	備考	化学放射線療法後の維持療法、2コース									
nab-PTX +CBDCA	アブラキサン	注	100	mg/m ²	○				○		
	カルボプラチン	注	6	AUC	○						
	備考	6コースまで									
VNR	ロゼウス	注	25	mg/m ²	○				○		
	備考										
アバスチン (維持)	アバスチン	注	15	mg/kg	○						
	備考	維持療法									
アバスチン+ CBDCA +PEM	アバスチン	注	15	mg/kg	○						
	アリムタ	注	500	mg/m ²	○						
	カルボプラチン	注	5	AUC	○						
	備考	6コースまで、その後維持療法へ									
アバスチン +PEM (維持)	アバスチン	注	15	mg/kg	○						
	アリムタ	注	500	mg/m ²	○						
	備考	維持療法									
アバスチン	アバスチン	注	15	mg/kg	○						

<u>CDDP+VP-16</u> <u>(+RT)</u>	備考																											
	エトポシド	注	100	mg/m ²	○	○	○																					
	シスプラチン	注	80	mg/m ²	○																							
	備考	放射線療法併用の場合あり																										

無断転載禁止