泌尿器科 腎癌

投与間隔　：　7　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）						
					1	2	3	4	5	6	7
トーリセル単剤	トーリセル	注	25	mg	○						
	備考										

投与間隔　：　14　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オプジーボ（2週毎）	オプジーボ	注	240	mg	○													
	備考																	
バベンチオ＋インライタ	バベンチオ	注	10	mg/kg	○													
	インライタ	内服	10 (mg/日)	朝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	備考																	

投与間隔　：　21　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オプジーボ＋ヤーボイ	オプジーボ	注	240	mg	○																				
	ヤーボイ	注	1	mg/kg	○																				
	備考																								
キイトルーダ	キイトルーダ	注	200	mg	○																				

| | | |