消化器外科　食道癌

投与間隔　：　14　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オプジーボ (食道)	オプジーボ	注	240	mg	○													
	備考																	

投与間隔　：　21　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
DTX Triweekly	ドセタキセル	注	70	mg/m^2	○																				
	備考																								
キイトルーダ +FP	キイトルーダ	注	200	mg	○																				
	フルオロウラシル	注	800	mg/m^2	○	○	○	○	○	→															
	シスプラチン	注	80	mg/m^2	○																				
	備考	フルオロウラシル：120時間持続投与																							
キイトルーダ +FP	キイトルーダ	注	200	mg	○																				
	フルオロウラシル	注	800	mg/m^2	○	○	○	○	○	→															
	備考	フルオロウラシル：120時間持続投与																							

投与間隔　：　28　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	フルオロウラシル	注	800	mg/m^2	○	○	○	○	○	→																						

| | | |