

# 血液内科 多発性骨髄腫

投与間隔 : 21 日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール (日)																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>BD</b>	ベルケイド	注	1.3 mg/m <sup>2</sup>	○			○					○			○									
	デキサメタゾン	内服	40 mg	○			○					○			○									
	備考	デキサメタゾンは適宜減量																						
<b>CBD</b>	エンドキサン	注	500 mg/m <sup>2</sup>	○								○												
	ベルケイド	注	1.3 mg/m <sup>2</sup>	○			○					○			○									
	デキサメタゾン	注	40 mg	○								○					○							
	備考	デキサメタゾンは内服可・適宜減量																						
<b>BDR</b>	ベルケイド	注	1.3 mg/m <sup>2</sup>	○			○					○			○									
	リツキシマブ	注	375 mg/m <sup>2</sup>												○									
	デキサメタゾン	内服	40 mg	○			○					○			○									
	備考	デキサメタゾンは静脈内投与可・適宜減量																						
<b>DCEP</b>	エトポシド	注	40 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○	○																	
	エンドキサン	注	400 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○	○																	
	シスプラチン	注	10 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○	○																	
	デキサート	注	40 mg	○	○	○	○																	
	備考																							
<b>DVd (皮下投与)</b>	ダラキューロ	注	1800 mg	○								○								○				
	ベルケイド	注	1.3 mg/m <sup>2</sup>	○			○					○			○									
	デキサメタゾン	内服	40 mg	○			○					○			○									
			20 mg																		○			
	備考	ベルケイドは8コース目まで投与、デキサメタゾンは適宜減量 ダラキューロは、4-8コース目はday1に投与、9コース目以降は4週1コースのday1に投与																						



<b>(3コース目以降)</b>	デキサメタゾン	注	40	mg	○				○					○					○
	備考	ポマリストは適宜減量、デキサメタゾンは内服可・適宜減量																	
<b>KRd (1コース目)</b>	カイプロリス	注	20	mg/m <sup>2</sup>	○	○													
			27	mg/m <sup>2</sup>						○	○								
	レブラミド	内服	25	mg	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	デキサメタゾン	注	40	mg	○					○					○				○
	備考	レブラミドは適宜減量、デキサメタゾンは内服可・適宜減量																	
<b>KRd (2コース目以降)</b>	カイプロリス	注	27	mg/m <sup>2</sup>	○	○													
	レブラミド	内服	25	mg	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	デキサメタゾン	注	40	mg	○					○					○				○
	備考	レブラミドは適宜減量、デキサメタゾンは内服可・適宜減量 カイプロリスは、13コース目以降はday1、2、15、16に投与																	
<b>Kd (週2回、 1コース目)</b>	カイプロリス	注	20	mg/m <sup>2</sup>	○	○													
			56	mg/m <sup>2</sup>						○	○				○	○			
	デキサメタゾン	注	20	mg	○	○				○	○				○	○			○
	備考	デキサメタゾンは内服可・適宜減量																	
<b>Kd (週2回、 2コース目以降)</b>	カイプロリス	注	56	mg/m <sup>2</sup>	○	○													
	デキサメタゾン	注	20	mg	○	○				○	○				○	○			○
	備考	デキサメタゾンは内服可・適宜減量																	
<b>Kd (週1回、 1コース目)</b>	カイプロリス	注	20	mg/m <sup>2</sup>	○														
			70	mg/m <sup>2</sup>						○					○				
	デキサメタゾン	注	40	mg	○					○					○				○
	備考	デキサメタゾンは内服可・適宜減量																	
<b>Kd (週1回、 2コース目以降)</b>	カイプロリス	注	70	mg/m <sup>2</sup>	○					○					○				
	デキサメタゾン	注	40	mg	○					○					○				○
	備考	デキサメタゾンは内服可・適宜減量																	
<b>DKd (皮下投与)</b>	ダラキューロ	注	1800	mg	○					○					○				○
	カイプロリス	注	20	mg/m <sup>2</sup>	○	○													
			56	mg/m <sup>2</sup>						○	○				○	○			



<b>D-VMP</b>	ベルケイド	注	1.3	mg/m <sup>2</sup>	○					○					○	○	○	○				
	アルケラン	内服	9	mg/m <sup>2</sup>	○	○	○	○														
	プレドニン	内服	60	mg/m <sup>2</sup>		○	○	○														
	デキサメタゾン	注	20	mg	○					○					○	○			○		○	
	備考	デキサメタゾンは内服可・適宜減量 ダラザレックスは、2-9コース目はday1とday22、10コース目以降は4週1コースのday1に投与 ベルケイドは、2コース目以降はday1、8、22、29に投与し、9コース目まで投与																				
<b>D-VMP (皮下投与)</b>	ダラキューロ	注	1800	mg	○					○					○	○			○		○	
	ベルケイド	注	1.3	mg/m <sup>2</sup>	○					○					○	○			○	○		
	アルケラン	内服	9	mg/m <sup>2</sup>	○	○	○	○														
	プレドニン	内服	60	mg/m <sup>2</sup>		○	○	○														
	デキサメタゾン	内服	20	mg	○					○					○	○			○		○	
備考	デキサメタゾンは静脈内投与可・適宜減量 ダラキューロは、2-9コース目はday1とday22、10コース目以降は4週1コースのday1に投与 ベルケイドは、2コース目以降はday1、8、22、29に投与し、9コース目まで投与																					