

血液内科 造血幹細胞移植

投与間隔 : 未設定

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール (日)																						
					-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	・	・	・	・									
CY-TBI	エンドキサン	注	60	mg/kg																							
	備考	エンドキサン投与時にはメスナ投与																									
ivBU/CY (1日1回)	ブスルフェクス	注	3.2	mg/kg																							
	エンドキサン	注	60	mg/kg																							
	備考	エンドキサン投与時にはメスナ投与																									
ivBU/CY (1日4回)	ブスルフェクス	注	0.8	mg/kg																							
	エンドキサン	注	60	mg/kg																							
備考	エンドキサン投与時にはメスナ投与																										
FM(140) RIST	フルダラ	注	25	mg/m2																							
	アルケラン	注	70	mg/m2																							
	備考																										
FM(180) RIST	フルダラ	注	25	mg/m2																							
	アルケラン	注	90	mg/m2																							
	備考																										
LEED	アルケラン	注	130	mg/m2																							
	エンドキサン	注	60	mg/kg																							
	エトポシド	注	500	mg/m2																							
	デキサート	注	5	V																							
	備考	エンドキサン投与時にはメスナ投与																									

