泌尿器科 尿路上皮がん

投与間隔　：　14　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
dd-MVAC	メソトレキセート	注	30	mg/m^2	○													
	エクザール	注	3	mg/m^2		○												
	ドキソルビシン	注	30	mg/m^2		○												
	シスプラチン	注	70	mg/m^2		○												
	備考																	
バベンチオ	バベンチオ	注	10	mg/kg	○													
	備考																	

投与間隔　：　21　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
GC	ゲムシタビン	注	1000	mg/m^2	○							○													
	シスプラチン	注	70	mg/m^2		○																			
	備考																								
GC変法（CBDCA）	ゲムシタビン	注	1000	mg/m^2	○							○													
	カルボプラチン	注	5	AUC		○																			
	備考																								
GDC	ゲムシタビン	注	750	mg/m^2	○							○													
	ドセタキセル	注	50	mg/m^2	○																				
	カルボプラチン	注	5	AUC	○																				
	備考																								

キイトルーダ（3週毎）	キイトルーダ	注	200	mg	○
	備考				

投与間隔　：　28　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
MVAC	メソトレキセート	注	30	mg/m^2	○														○							○						
	エクザール	注	3	mg/m^2		○													○							○						
	ドキソルビシン	注	30	mg/m^2		○																										
	シスプラチン	注	70	mg/m^2		○																										
	備考																															
パドセブ	パドセブ	注	1.25	mg/kg	○							○							○													
	備考																															

投与間隔　：　42　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																											
					1	・	・	・	8	・	・	・	15	・	・	・	22	・	・	・	・	29	・	・	・	・	35	・	・	・	・	42
キイトルーダ（6週毎）	キイトルーダ	注	400	mg	○																											
	備考																															