消化器外科　膵癌

投与間隔　：　14　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
FOLFIRINOX (Fulldose)	オキサリプラチン	注	85　mg/m^2	○													
	レボホリナート	注	200　mg/m^2	○													
	イリノテカン	注	180　mg/m^2	○													
	フルオロウラシル（急速）	注	400　mg/m^2	○													
	フルオロウラシル（46時間持続）	注	2400　mg/m^2	○	→	→											
	備考																
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、脱毛、口内炎、しびれ、アレルギーなど															

投与間隔　：　28　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）																										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
GEM	ゲムシタビン	注	1000　mg/m^2	○							○							○													
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、血管痛など																													
GEM+nabPTX	ゲムシタビン	注	1000　mg/m^2	○							○							○													
	アブラキサン	注	125　mg/m^2	○							○							○													
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、脱毛、しびれ、血管痛、筋肉痛・関節痛など																													