

	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、腎機能障害など																		
FP	フルオロウラシル	注	800	mg/m ²	○	○	○	○	○	→										
	シスプラチン	注	80	mg/m ²	○															
	備考	フルオロウラシル：120時間持続投与																		
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、腎機能障害など																		
Nivo+FP	オブジーボ	注	480	mg	○															
	フルオロウラシル	注	800	mg/m ³	○	○	○	○	○	→										
	シスプラチン	注	80	mg/m ²	○															
	備考	フルオロウラシル：120時間持続投与																		
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、腎機能障害、免疫関連有害事象など																		

投与間隔 : 42 日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール (日)																
				1	...	8	...	15	...	22	...	29	...	35	...	42				
キイトルーダ (6週毎)	キイトルーダ	注	400	mg	○															
	備考																			
	副作用	免疫関連有害事象																		
オブジーボ(3w) +ヤーボイ(食道)	オブジーボ	注	360	mg	○							○								
	ヤーボイ	注	1	mg/kg	○															
	備考																			
	副作用	免疫関連有害事象																		