

血液内科 白血病

投与期間：未設定

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール（日）																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
マイロターグ	マイロターグ	注	9 mg/m ²	○													○														
	備考	3-6mg/m ² に減量することもあり																													
	副作用	骨髄抑制、悪心、便秘、下痢、口内炎、倦怠感、肝機能障害、infusion reacitonなど																													
HAM	シタラビン	注	2000 mg/m ²	○	○	○	○																								
				○	○	○	○																								
	ノバントロン	注	10 mg/m ²	○	○																										
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、悪心、下痢、皮膚障害、肝機能障害、心機能障害、結膜炎など																													
CA（G）	キロサイド	注	20 mg/m ²	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															
	アクラシノン	注	14 mg/m ²	○	○	○	○																								
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、悪心、下痢、皮膚障害、心機能障害など																													

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール（日）								
<u>アーゼラ</u> <u>販売中止？</u>	アーゼラ	注	(初回) 300 mg									
			(以降) 2000 mg									
	備考	初回は300mg・2-8回目は2000mgを1週間隔、以降4週間隔で9-12回目投与、詳細は添付文書参照										
	副作用											

[illegible]

<u>ベスポンサ</u>	ベスポンサ	注	0.8 mg/m ²	○															
			0.5 mg/m ²						○					○					
	備考	寛解が得られた場合は、2サイクル目から0.5mg/m ² で投与 投与間隔は1サイクル目は21-28日、2サイクル目以降は28日																	
	副作用	骨髄抑制、悪心、下痢、肝機能障害、infusion reacitonなど																	

[illegible]

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール（日）																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
<u>Augmented</u> <u>Hyper-CVAD</u>	エンドキサン	注	300	mg/m ²	○	○	○																									
	ドキシソルビシン	注	50	mg/m ²				○																								
	オンコビン	注	2	mg/body	○						○							○														
	ロイナーゼ	注	4	V/body		○						○							○													
	デキサート	注	66	mg	○	○	○	○											○	○	○	○										
	備考																															
	副作用	骨髄抑制、悪心、便秘、脱毛、しびれ、倦怠感、心機能障害、急性膵炎、アレルギーなど																														

[illegible]

אחרי הצהריים

[illegible]

地固め2コース

[illegible]

維持療法

[illegible][illegible]

[illegible]

JALSG T-ALL213-0

[illegible]

寛解導入療法2 (非寛解例)

[illegible]

地固め1,4コース

[illegible]

地固め2コース

[illegible][illegible]

地固め5コース

[illegible]

維持療法

[illegible]

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール（日）																											
				1	・	8	・	15	・	22	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
地固め3コース	オンコビン	注	1.3	mg/m ²	○		○		○																						
	エンドキサン	注	1200	mg/m ²												○															
	ドキシソルビシン	注	30	mg/m ²	○		○		○																						
	キロサイド	注	75	mg/m ²												○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			
	アラノンジ	注	1500	mg/m ²						○		○		○																	
	デキサメタゾン	内服	10	mg/m ²	○	○	○		○	○	○																				
	ロイケリン	内服	60	mg/m ²													○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	キロサイド*	髄注	40	mg/body	○												○														
	メソトレキセート*	髄注	15	mg/body	○												○														
	デキサート*	髄注	3.3	mg/body	○												○														
備考	ロイケリン散はday36-49のねる前に内服。 デキサメタゾンはday1-8、day15-22に内服。																														
副作用	骨髄抑制、悪心、便秘、下痢、しびれ、口内炎、脱毛、倦怠感、出血性膀胱炎、神経系障害（傾眠、めまいなど）、肝機能障害、心機能障害など																														

JALSG Ph+ ALL219

[illegible]

[illegible][illegible]

