血液内科 造血幹細胞移植

投与間隔 : 未設定

レジメン名	商品名	剤形	∔ Љ	与量	スケジュール (日)										
レジスノ石	间吅石	月リガシ	1又-	ナ里	-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 •••••••										
	エンドキサン	注	60	mg/kg											
<u>CY-TBI</u>	備考	エント	ドキサン	/投与時に	はメスナ投与										
	副作用	骨髄排	卬制、悪	心、出血	性膀胱炎など										
	ブスルフェクス	注	3.2	mg/kg											
ivBU/CY	エンドキサン	注	60	mg/kg											
(1日1回)	備考	エント	エンドキサン投与時にはメスナ投与												
	副作用	骨髄排	卬制、悪	心、味覚	異常、下痢、口内炎、 <mark>肝機能障害、痙攣、出血性膀胱炎など</mark>										
	 ブスルフェクス	注	0.8	mg/kg											
ivBU/CY		1													
(1日4回)															
(<u>тн</u> 4न)	エンドキサン	注	60	mg/kg											
	備考	エント	ドキサン	/投与時に	はメスナ <mark>投与</mark>										
	副作用	骨髄排	印制、悪	心、味覚	異常、下痢、口内炎、肝機能障害、痙攣、出血性膀胱炎など										
	フルダラ	注	25	mg/m2											
<u>FM(140)</u>	アルケラン	注	70	mg/m2											
RIST	備考	-													
	副作用	骨髄排	叩制、悪	心、下痢	「、口内炎、粘膜炎、肝機能障害、心機能障害など										
	フルダラ	注	25	mg/m2											
FM(180)	アルケラン	注	90	mg/m2											
RIST	備考														
	副作用	骨髄排	卬制、悪	心、下痢	「、口内炎、粘膜炎、肝機能障害、心機能障害など										

	711 / =>	54	120											$\overline{}$		-				$\overline{}$	-			-
	アルケラン	注	130	mg/m2						0				_										
	エンドキサン	注	60	mg/kg				0	0															
<u>LEED</u>	エトポシド	注	500	mg/m2					00	0														
LEED	デキサート	注	5	V				0	0 0	0														
	備考	エント	ドキサン	/投与時に	はメスナ投与																			
	副作用	骨髄抑	卬制、悪	心、脱毛	、下痢	Ī、ΠΙ	内炎、	粘	膜炎、	下痢、	肝核	幾能障	害、	心機	能障	害、	出血	1性月	旁胱统	炎な	تع:			
	サイメリン	注	300	mg/m2		(C																	
	エトポシド	注	200	mg/m2			0	0	00															
	キロサイド	注	200	ma/m2			0	0	00															
<u>MEAM</u>	イロリイド 	/±	200	mg/m2			0	0	00					1										
	アルケラン	注	140	mg/m2						0			1											
	備考										31		14		1			-					 	
	副作用	骨髄抑	卬制、悪	心、脱毛	、下痢	Ī、□Ι	内炎、	粘	膜炎、	肝機能	能障害	島、心	い機能	 障害	など									
	ブフリフェクフ	<u>;</u>				(0 0	0																
			0.0	(l		0 (0 0																	
		;+	0.0	ma/ka																		-		
	ブスルフェクス	注	0.8	mg/kg										+						+				
	ノスルフェクス	注 	0.8	mg/kg		0 0																		
<u>BUCYE</u>						0 0		0																
<u>BUCYE</u>	エトポシド	注 	200	mg/kg		0 0		0																
<u>BUCYE</u>						0 0	0 0	0																
<u>BUCYE</u>	エトポシド	注	200	mg/m²	THE REPORT OF THE PROPERTY OF	0 0	0 0	0	0 0				анинания финанский пинично миничный миничный											
<u>BUCYE</u>	エトポシド	注注	200	mg/m²	異常、						幾能阿		痙攣	拳、 出	<u>шини и и и и и и и и и и и и и и и и и и</u>	·····································	送 次た							
BUCYE	エトポシド エンドキサン 備考	注注	200 50 印制、悪	mg/m²	異常、					€、肝‡	幾能阿		痙攣	≜、出		·····································	: (大)							
BUCYE HD L-PAM	エトポシド エンドキサン 備考 副作用	注注	200 50 印制、悪	mg/m² mg/kg 訳心、味覚	異常、				二内炎	€、肝‡	幾能		·····································	◆、 仕	\$ <u></u>	· 排旁]}\	3 炎た							

投与間隔 : 未設定

1 2".12 47	苗 口 <i>勺</i>	文川 田乙	; +л.	岁量	スケジュール (日)											
レジメン名	商品名	剤形	乜		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14											
	メソトレキセート	注	10	mg/m ²												
		注	7	mg/m ²												
short MTX+LV																
		注	15	mg/m ²												
	ロイコボリン															
	備考	'_														
			10	mg/m ²												
		移植後	6免疫抑	7制 ————————————————————————————————————												
	副作用				(12)											
	メソトレキセート	注	10	mg/m ²												
			7	mg/m ²												
short MTX+LV		注:		mg/m ²												
(day1、3、	ロイコボリン															
6、11)				mg/m²												
<u> </u>																
	,															
	備考	移植物	後免疫扛	圳制												
	副作用	()	7													
	メソトレキセート	注		mg/m ²												
		1	10	mg/m ²												
			15	5 mg/m²												
-1 1 54-25																
short MTX+LV	ロイコボリン	注														
<u>(原法)</u>																

	10 mg/m ²
備考	移植後免疫抑制
副作用	

