

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <u>CHOP</u> | プレドニン | 内服 | 60 mg/m ² | 朝 | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 昼 | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エンドキサン | 注 | 750 | mg/m ² | | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| | ドキシソルビシン | 注 | 50 | mg/m ² | | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| | オンコビン | 注 | 1.4 | mg/m ² | | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| | 備考 | プレドニン：最大100mg/日、適宜減量あり | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 副作用 | 骨髄抑制、悪心、便秘、脱毛、しびれ、倦怠感、心機能障害など | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>R-CHOP</u> | プレドニン | 内服 | 60 mg/m ² | 朝 | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 昼 | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | リツキシマブ | 注 | 375 | mg/m ² | | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| | エンドキサン | 注 | 750 | mg/m ² | | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| | ドキシソルビシン | 注 | 50 | mg/m ² | | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| | オンコビン | 注 | 1.4 | mg/m ² | | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | プレドニン：最大100mg/日、適宜減量あり。リツキシマブはCHOPと別日に投与する場合あり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 副作用 | 骨髄抑制、悪心、便秘、脱毛、しびれ、倦怠感、心機能障害、infusion reactionなど | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>R-miniCHOP</u> | プレドニン | 内服 | 60 mg/日 | 朝 | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 昼 | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | リツキシマブ | 注 | 375 | mg/m ² | | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| | エンドキサン | 注 | 400 | mg/m ² | | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| | ドキシソルビシン | 注 | 25 | mg/m ² | | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| | オンコビン | 注 | 1 | mg/body | | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | プレドニン：最大60mg/日、適宜減量あり。リツキシマブはCHOPと別日に投与する場合あり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 副作用 | 骨髄抑制、悪心、便秘、脱毛、しびれ、倦怠感、心機能障害、infusion reactionなど | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>CHASE</u> | デキサート | 注 | 5 | V | | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| | エンドキサン | 注 | 1200 | mg/m ² | | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| | エトポシド | 注 | 100 | mg/m ² | | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| | シタラビン | 注 | 2000 | mg/m ² | | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--|------|-------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 備考 | デキサメタゾン は内服でも可 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 副作用 | 骨髄抑制、悪心、倦怠感、腎機能障害、肺機能障害、血管痛など | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R-GDP | リツキシマブ | 注 | 375 | mg/m ² | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | デキサート | 注 | 5 | V | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | ゲムシタビン | 注 | 1000 | mg/m ² | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| | シスプラチン | 注 | 75 | mg/m ² | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 備考 | デキサメタゾン は内服でも可、リツキシマブ はGDP と同日に投与する場合あり | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 副作用 | 骨髄抑制、悪心、倦怠感、腎機能障害、肺機能障害、血管痛、infusion reaction など | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DeVIC | デキサート | 注 | 5 | V | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| | エトポシド | 注 | 100 | mg/m ² | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| | イホマイド | 注 | 1500 | mg/m ² | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| | カルボプラチン | 注 | 300 | mg/m ² | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 副作用 | 骨髄抑制、悪心、脱毛、口内炎、倦怠感、出血性膀胱炎、腎機能障害、アレルギー など | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R-DeVIC | リツキシマブ | 注 | 375 | mg/m ² | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | デキサート | 注 | 5 | V | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| | エトポシド | 注 | 100 | mg/m ² | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| | イホマイド | 注 | 1500 | mg/m ² | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| | カルボプラチン | 注 | 300 | mg/m ² | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 備考 | リツキシマブ はDeVIC と同日に投与する場合あり | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 副作用 | 骨髄抑制、悪心、脱毛、口内炎、倦怠感、出血性膀胱炎、腎機能障害、アレルギー、infusion reaction など | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPOCH | プレドニン | 内服 | 60 | mg/m ² | 朝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| | | | | | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| | エトポシド | 注 | 50 | mg/m ² | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | オンコビン | 注 | 0.4 | mg/m ² | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | ドキシソルビシン | 注 | 10 | mg/m ² | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | エンドキサン | 注 | 750 | mg/m ² | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 備考 | プレドニン：最大100mg/日、適宜減量あり。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

投与間隔 : 28 日

| レジメン名 | 商品名 | 剤形 | 投与量 | スケジュール (日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|-----------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ABVD | ドキシソルビシン | 注 | 25 mg/m ² | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブレオ | 注 | 10 mg/m ² | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | エクザール | 注 | 6 mg/m ² | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダカルバジン | 注 | 375 mg/m ² | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 副作用 | 骨髄抑制、悪心、便秘、脱毛、しびれ、倦怠感、血管痛、肺機能障害、心機能障害など | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A+AVD | アドセトリス | 注 | 1.2 mg/kg | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | ドキザゾシン | 注 | 25 mg/m ² | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | エクザール | 注 | 6 mg/m ² | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダカルバジン | 注 | 375 mg/m ² | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 副作用 | 骨髄抑制、悪心、便秘、脱毛、しびれ、倦怠感、血管痛、肺機能障害、心機能障害、infusion reactionなど | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>トレアキシ</u> <u>/リツキシマブ</u> | トレアキシ | 注 | 90 mg/m ² | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | リツキシマブ | 注 | 375 mg/m ² | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 備考 | リツキシマブはトレアキシと別日に投与する場合あり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 副作用 | 骨髄抑制、悪心、皮膚障害、血管痛、infusion reactionなど | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>トレアキシ</u> | トレアキシ | 注 | 120 mg/m ² | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 副作用 | 骨髄抑制、悪心、皮膚障害、血管痛など | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>トレアキシ</u> <u>/ガザイバ</u> | トレアキシ | 注 | 90 mg/m ² | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ガザイバ | 注 | 1000 mg | ○ | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 備考 | 2コース目からガザイバはday1のみ投与、ガザイバはトレアキシと別日に投与する場合あり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 副作用 | 骨髄抑制、悪心、皮膚障害、血管痛、infusion reactionなど | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ガザイバ（維持）

| | |
|-----|-----------------------------|
| 備考 | ガザイバ単独投与時は2ヶ月に1回投与。最長2年間投与。 |
| 副作用 | infusion reactionなど |

無断転載禁止