

産婦人科

投与間隔 : 7 日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール (日)																
				1	2	3	4	5	6	7										
CDDP+RT	シスプラチン	注	40 mg/m ²	○																
	備考																			
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感、口内炎、腎機能障害など																		
MTX筋注	メソトレキサート	注	50 mg	○																
	備考																			
	副作用	骨髄抑制、吐き気、口内炎など																		
アクプラ+RT	アクプラ	注	30 mg/m ²	○																
	備考																			
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感など																		

投与間隔 : 14 日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール (日)																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
MTX筋注 (絨毛性疾患)	メソトレキサート	注	0.4 mg/kg	○	○	○	○	○													
	備考																				
	副作用	骨髄抑制、吐き気、口内炎など																			

投与間隔 : 21 日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール (日)																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

<u>CBDCA単剤</u>	備考																			
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感、アレルギーなど																		
<u>CDDP単剤</u>	シスプラチン	注	70	mg/m ²	○															
	備考																			
<u>ドキシソルビシン単剤</u>	ドキシソルビシン	注	50	mg/m ²	○															
	備考																			
<u>アクプラ単剤</u>	アクプラ	注	80	mg/m ²	○															
	備考																			
<u>DOC+GEM (肉腫)</u>	ドセタキセル	注	60	mg/m ²						○										
	ゲムシタビン	注	800	mg/m ²	○					○										
<u>BEP</u>	ブレオ	注	20	mg/m ²	○					○					○					
	エトポシド	注	100	mg/m ²	○	○	○	○	○											
<u>Bev+GEM</u>	シスプラチン	注	20	mg/m ²	○	○	○	○	○											
	備考																			
<u>Bev+リムパーザ (維持)</u>	アバスチン	注	15	mg/kg	○															
	ゲムシタビン	注	1000	mg/m ²	○					○										
<u>Bev+リムパーザ (維持)</u>	備考																			
	副作用	末梢神経障害、便秘、間質性肺炎など																		
<u>Bev+リムパーザ (維持)</u>	アバスチン	注	15	mg/kg	○															
	リムパーザ	内服	300(mg)/回	朝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<u>Bev+リムパーザ (維持)</u>	備考																			
	副作用	骨髄抑制、血管痛、高血圧、尿蛋白、出血など																		
<u>Bev+リムパーザ (維持)</u>	アバスチン	注	15	mg/kg	○															
	リムパーザ	内服	300(mg)/回	朝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<u>Bev+リムパーザ (維持)</u>	備考																			
	副作用	骨髄抑制、血管痛、高血圧、尿蛋白、出血など																		

