

<u>CBDCA単剤</u>	備考																			
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感、アレルギーなど																		
<u>CDDP単剤</u>	シスプラチン	注	70	mg/m ²	○															
	備考																			
<u>ドキシソルビシン単剤</u>	ドキシソルビシン	注	50	mg/m ²	○															
	備考																			
<u>アクプラ単剤</u>	アクプラ	注	80	mg/m ²	○															
	備考																			
<u>DOC+GEM (肉腫)</u>	ドセタキセル	注	60	mg/m ²						○										
	ゲムシタビン	注	800	mg/m ²	○					○										
<u>BEP</u>	ブレオ	注	20	mg/m ²	○					○					○					
	エトポシド	注	100	mg/m ²	○	○	○	○	○											
<u>Bev+GEM</u>	シスプラチン	注	20	mg/m ²	○	○	○	○	○											
	備考																			
<u>Bev+リムパーザ (維持)</u>	アバスチン	注	15	mg/kg	○															
	ゲムシタビン	注	1000	mg/m ²	○					○										
<u>Bev+リムパーザ (維持)</u>	備考																			
	副作用	末梢神経障害、便秘、間質性肺炎など																		
<u>Bev+リムパーザ (維持)</u>	アバスチン	注	15	mg/kg	○															
	リムパーザ	内服	300(mg)/回	朝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<u>Bev+リムパーザ (維持)</u>	備考																			
	副作用	骨髄抑制、血管痛、高血圧、尿蛋白、出血など																		
<u>Bev+リムパーザ (維持)</u>	アバスチン	注	15	mg/kg	○															
	リムパーザ	内服	300(mg)/回	朝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<u>Bev+リムパーザ (維持)</u>	備考																			
	副作用	骨髄抑制、血管痛、高血圧、尿蛋白、出血など																		

