

呼吸器内科 非小細胞肺癌

投与間隔：7 日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール（日）																											
				1	2	3	4	5	6	7																					
<u>PTX+</u> <u>CBDCA(AUC2)</u> <u>+RT</u>	パクリタキセル	注	40	mg/m ²	○																										
	カルボプラチン	注	2	AUC	○																										
	備考	化学放射線療法、6コース																													
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、脱毛、倦怠感、しびれ、関節痛・筋肉痛、アレルギーなど																													
<u>CBDCA(Daily)</u> <u>+RT</u>	カルボプラチン	注	30	mg/m ²	○	○	○	○	○																						
	備考	合計20回投与（40Gy照射までに）																													
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、アレルギーなど																													

投与間隔：14 日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール（日）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

投与間隔：21 日

商品名	品名	形状	投与量	スケジュール (日)
-----	----	----	-----	------------

[illegible]

[illegible]

投与間隔　：　28　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール（日）																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<u>CDDP+VNR</u>	□ゼウス	注	20	mg/m ²	○								○																		
	シスプラチン	注	80	mg/m ²	○																										
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、口内炎、倦怠感、腎機能障害、血管痛など																													
<u>CDDP+VNR</u> <u>（術後）</u>	□ゼウス	注	25	mg/m ²	○								○																		
	シスプラチン	注	40	mg/m ²	○								○																		
	備考	術後補助化学療法（４コース）																													
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、口内炎、倦怠感、腎機能障害、血管痛など																													
<u>DTX Weekly</u>	ドセタキセル	注	25	mg/m ²	○								○					○													
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、脱毛、倦怠感、アレルギー、浮腫など																													
<u>CDDP+VNR</u> <u>RT</u> <u>（患者限定）</u>	□ゼウス	注	20	mg/m ²	○								○																		
	シスプラチン	注	80	mg/m ²	○																										
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、口内炎、倦怠感、腎機能障害、血管痛など																													

投与間隔　：　42　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール（日）																											
					1	.	.	.	8	.	.	.	15	.	.	.	22	.	.	.	29	.	.	.	.	35	.	.	.	.	42	
<u>キイトルーダ</u> <u>（6週毎）</u>	キイトルーダ	注	400	mg	○																											
	備考																															
	副作用	免疫関連有害事象																														

[illegible]

呼吸器内科 小細胞肺癌

投与間隔：21 日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール（日）																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
<u>テセントリク+ CBDCA+VP-16</u>	テセントリク	注	1200	mg	○																										
	エトポシド	注	100	mg/m2	○	○	○																								
	カルボプラチン	注	5	AUC	○																										
	備考	4コースまで、その後維持療法へ																													
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感、アレルギー、免疫関連有害事象など																													
<u>イミフィンジ+ CBDCA+VP-16</u>	イミフィンジ	注	1500	mg	○																										
	エトポシド	注	100	mg/m2	○	○	○																								
	カルボプラチン	注	5	AUC	○																										
	備考	4コースまで、その後維持療法へ																													
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感、アレルギー、免疫関連有害事象など																													
<u>イミフィンジ+ CDDP+VP-16</u>	イミフィンジ	注	1500	mg	○																										
	エトポシド	注	100	mg/m2	○	○	○																								
	シスプラチン	注	80	mg/m2	○																										
	備考	4コースまで、その後維持療法へ																													
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感、腎機能障害、免疫関連有害事象など																													

投与間隔：28 日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール（日）																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
AMR	カルセド	注	40	mg/m ²	○	○	○																								
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感など																													
CBDCA+CPT-11	イリノテカン	注	50	mg/m ²	○						○							○													
	カルボプラチン	注	5	AUC	○																										
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、下痢、口内炎、倦怠感、アレルギーなど																													
CBDCA+VP-16	エトポシド	注	80	mg/m ²	○	○	○																								
	カルボプラチン	注	5	AUC	○																										
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感、アレルギーなど																													
CDDP+CPT-11	イリノテカン	注	60	mg/m ²	○						○							○													
	シスプラチン	注	60	mg/m ²	○																										
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、下痢、口内炎、倦怠感、腎機能障害など																													
CPT-11	イリノテカン	注	100	mg/m ²	○						○							○													
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、下痢、口内炎、倦怠感など																													
CDDP+VP-16 （+RT）	エトポシド	注	100	mg/m ²	○	○	○																								
	シスプラチン	注	80	mg/m ²	○																										
	備考	放射線療法併用の場合あり																													
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感、アレルギー、腎機能障害など																													
イミフィンジ維持 （SCLC）	イミフィンジ	注	1500	mg	○																										
	備考																														
	副作用	免疫関連有害事象																													

呼吸器内科 悪性中皮腫

投与間隔：42 日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール（日）																											
					1	・	・	・	8	・	・	・	15	・	・	・	22	・	・	・	29	・	・	・	・	35	・	・	・	・	42	
<u>オブジーボ(3w)</u> <u>+ ヤーボイ(中皮腫)</u>	オブジーボ	注	360	mg	○											○																
	ヤーボイ	注	1	mg/kg	○																											
	備考																															
	副作用	免疫関連有害事象																														