泌尿器科 前立腺癌

投与間隔　：　21　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
ドセタキセル＋ステロイド	ドセタキセル	注	70　mg/m^2		○																															
	プレドニゾロン	内服	10 (mg/日)	朝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
				夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
	備考	ステロイドはデキサメタゾン 1mg/日を用いる場合あり																																		
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、脱毛、倦怠感、浮腫など																																		
ジェブタナ＋ステロイド	ジェブタナ	注	20　mg/m^2		○																															
	プレドニゾロン	内服	10 (mg/日)	朝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
				夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
	備考	ステロイドはデキサメタゾン 1mg/日を用いる場合あり																																		
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、脱毛、倦怠感など																																		