

消化器外科 胆道癌

投与間隔 : 14 日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール (日)																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
<u>GEM+CDDP +TS-1(GCS)</u>	ゲムシタビン	注	1000 mg/m ²	○																
	シスプラチン	注	25 mg/m ²	○																
	エスワン	注	80-120(mg)	朝 夕	○	○	○		○	○	○	○								
	備考																			
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚異常、下痢、口内炎、腎機能障害、血管痛、流涙など																		

投与間隔 : 21 日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール (日)																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<u>GEM+CDDP</u>	ゲムシタビン	注	1000 mg/m ²	○																				
	シスプラチン	注	25 mg/m ²	○																				
	備考																							
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚異常、腎機能障害、血管痛など																						
<u>イミフィンジ +GEM+CDDP</u>	イミフィンジ	注	1500 mg	○																				
	ゲムシタビン	注	1000 mg/m ²	○																				
	シスプラチン	注	25 mg/m ²	○																				
	備考	最大8コース実施。以後はイミフィンジ維持療法へ移行。																						
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚異常、腎機能障害、血管痛、免疫関連有害事象など																						

投与間隔 : 28 日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール (日)																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
GEM	ゲムシタビン	注	1000 mg/m ²	○																											
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、血管痛など																													

無断転載禁止