

レジメン名	商品名	剤形	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
5-FU(持続)	フルオロウラシル	注	800 mg/m ²	○	○	○	○	○	→																									
	備考	フルオロウラシル：120時間持続投与																																
	副作用	骨髄抑制など																																
CPT-11 weekly	イリノテカン	注	100 mg/m ²	○							○								○															
	備考																																	
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、口内炎など																																
サイラムザ+PTX	サイラムザ	注	8 mg/kg	○															○															
	パクリタキセル	注	80 mg/m ²	○							○								○															
	備考																																	
	副作用	骨髄抑制、脱毛、しびれ、過敏症・インフュージョンリアクション、関節痛・筋肉痛、高血圧、尿蛋白、出血など																																
PTX Weekly	パクリタキセル	注	80 mg/m ²	○							○								○															
	備考																																	
	副作用	骨髄抑制、脱毛、しびれ、アレルギー、関節痛・筋肉痛など																																
サイラムザ+nabPTX	サイラムザ	注	8 mg/kg	○															○															
	アブラキサン	注	100 mg/m ²	○							○								○															
	備考																																	
	副作用	骨髄抑制、脱毛、しびれ、インフュージョンリアクション、関節痛・筋肉痛、高血圧、尿蛋白、出血など																																

投与間隔：35日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール (日)																																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	・	・	・	34	35						
TS-1 +CDDP (TS-1 3投2休)	エスワン	内服	80-120(mg)	朝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
				夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	シスプラチン	注	60 mg/m ²								○																										
	備考																																				
副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、腎機能障害、流涙など																																				