脳神経外科

投与間隔　：　14　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
アバスチン2週毎	アバスチン	注	10　mg/kg	○													
	備考																
	副作用	高血圧、尿蛋白、出血など															

投与間隔　：　21　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アバスチン3週毎	アバスチン	注	15　mg/kg	○																			
	備考																						
	副作用	高血圧、尿蛋白、出血など																					

投与間隔　：　28　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）																									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ICE	エトポシド	注	100　mg/m2	○	○	○																									
	イホマイド	注	1500　mg/m^2	○	○	○																									
	カルボプラチン	注	300　mg/m^2	○																											
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、吐き気、口内炎、便秘、脱毛、倦怠感、アレルギー、排尿障害など																													