消化器外科　胃癌

投与間隔　：　14　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ｍＦＯＬＦＯＸ６	オキサリプラチン	注	85	mg/m^2	○
	レボホリナート	注	200	mg/m^2	○
	フルオロウラシル（急速）	注	400	mg/m^2	○
	フルオロウラシル（46時間持続）	注	2400	mg/m^2	○ → →
	備考				
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、しびれ、アレルギーなど			
Ｎｉｖｏ＋ｍＦＯＬＦＯＸ６	オプジーボ	注	240	mg	○
	オキサリプラチン	注	85	mg/m^2	
	レボホリナート	注	200	mg/m^2	○
	フルオロウラシル（急速）	注	400	mg/m^2	○
	フルオロウラシル（46時間持続）	注	2400	mg/m^2	○ → →
	備考				
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、しびれ、アレルギー、免疫関連有害事象など			
オプジーボ（胃）	オプジーボ	注	240	mg	○
	備考				
	副作用	免疫関連有害事象			
サイラムザ	サイラムザ	注	8	mg/kg	○
	備考				

	副作用	インフュージョンリアクション、高血圧、尿蛋白、出血など																							
CPT-11 Biweekly	イリノテカン	注	150	mg/m2	○																				
	備考																								
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、口内炎など																							
サイラムザ ＋CPT-11 （臨床試験）	サイラムザ	注	8	mg/kg	○																				
	イリノテカン	注	150	mg/m2	○																				
	備考																								
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、口内炎、インフュージョンリアクション、高血圧、尿蛋白、出血など																							

投与間隔　：　21　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
G－SOX	エスワン	内服	80-120(mg)	朝		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
				夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
	オキサリプラチン	注	100	mg/m2	○																				
	備考																								
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、口内炎、しびれ、アレルギー、流涙など																							
Nivo+SOX	オプジーボ	注	360	mg	○																				
	エスワン	内服	80-120(mg)	朝		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
				夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
	オキサリプラチン	注	130	mg/m2	○																				
	備考	高齢者など許容に難ある患者は100mg/m2																							
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、口内炎、しびれ、アレルギー、流涙、免疫関連有害事象など																							
XELOX	カペシタビン	内服	1200—2100(mg)/回	朝		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
				夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
	オキサリプラチン	注	130	mg/m2	○																				
	備考	カペシタビン：C法、適宜減量																							

	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、口内炎、しびれ、手足症候群、アレルギーなど																															
Nivo+XELOX	オプジーボ	注	360	mg		○																											
	カペシタビン	内服	1200–2100(mg)/回		朝		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													
					夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														
	オキサリプラチン	注	130	mg/m^2		○																											
	備考	カペシタビン：C法、適宜減量																															
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、口内炎、しびれ、手足症候群、アレルギー、免疫関連有害事象など																															
トラスツズマブ+Xeloda+CDDP	トラスツズマブ	注	(初回)8	mg/kg		○																											
			(以降)6	mg/kg																													
	カペシタビン	内服	1200–2100(mg)/回		朝		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													
					夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														
	シスプラチン	注	80	mg/m^2		○																											
	備考	カペシタビン：C法、適宜減量																															
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、口内炎、手足症候群、腎・心機能障害など																															
トラスツズマブ+XELOX	トラスツズマブ	注	(初回)8	mg/kg		○																											
			(以降)6	mg/kg																													
	カペシタビン	内服	1200–2100(mg)/回		朝		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													
					夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														
	オキサリプラチン	注	130	mg/m^2		○																											
	備考	カペシタビン：C法、適宜減量																															
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、口内炎、しびれ、手足症候群、アレルギー心機能障害など																															
DTX Triweekly	ドセタキセル	注	60	mg/m^2		○																											
	備考																																
	副作用	骨髄抑制、味覚障害、脱毛、しびれ、アレルギー、倦怠感、筋肉痛・関節痛など																															
TS-1+DTX	エスワン	内服	80-120(mg)		朝		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													
					夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														
	ドセタキセル	注	40	mg/m^2		○																											
	備考																																

	副作用	骨髄抑制、味覚障害、脱毛、口内炎、しびれ、アレルギー、倦怠感、筋肉痛・関節痛、流涙など																														
DOS（患者限定）	エスワン	内服	80-120(mg)	朝		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													
				夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														
	ドセタキセル	注	40	mg/m^2	○																											
	オキサリプラチン	注	100	mg/m^2	○																											
	備考																															
	副作用	骨髄抑制、味覚障害、脱毛、口内炎、しびれ、皮膚障害、アレルギー、倦怠感、筋肉痛・関節痛、流涙など																														
トラスツズマブ＋G-SOX	トラスツズマブ	注	(初回)8	mg/kg	○																											
			(以降)6	mg/kg																												
	エスワン	内服	80-120(mg)	朝		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													
				夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														
	オキサリプラチン	注	100	mg/m^2	○																											
	備考																															
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、口内炎、しびれ、アレルギー、流涙、心機能障害など																														
エンハーツ	エンハーツ	注	6.4	mg/kg	○																											
	備考																															
	副作用	骨髄抑制、吐き気、アレルギー、心機能障害、間質性肺炎など																														
S-1＋ipPTX+ivPTX（臨床試験）	エスワン	内服	80-120(mg)	朝		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													
				夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														
	パクリタキセル	静注	50	mg/m^2	○							○																				
	パクリタキセル	腹腔内	20	mg/m^2	○							○																				
	備考	1コース目は腹腔内投与のみ。腹腔内投与は最大30mg/回まで。																														
	副作用	骨髄抑制、下痢、口内炎、脱毛、しびれ、皮膚障害、アレルギー、関節痛・筋肉痛、流涙など																														

投与間隔　：　28　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

PTX Weekly	パクリタキセル	注	80	mg/m²	○							○							○													
	備考																															
	副作用	骨髄抑制、脱毛、しびれ、アレルギー、関節痛・筋肉痛など																														
サイラムザ +PTX	サイラムザ	注	8	mg/kg	○														○													
	パクリタキセル	注	80	mg/m²	○							○							○													
	備考																															
	副作用	骨髄抑制、脱毛、しびれ、過敏症・インフュージョンリアクション、関節痛・筋肉痛、高血圧、尿蛋白、出血など																														
サイラムザ +nabPTX	サイラムザ	注	8	mg/kg	○														○													
	アブラキサン	注	100	mg/m²	○							○							○													
	備考																															
	副作用	骨髄抑制、脱毛、しびれ、インフュージョンリアクション、関節痛・筋肉痛、高血圧、尿蛋白、出血など																														
5-FU (持続)	フルオロウラシル	注	800	mg/m²	○	○	○	○	○																							
	備考																															
	副作用	骨髄抑制など																														
nab-PTX Weekly	アブラキサン	注	100	mg/m²	○							○							○													
	備考																															
	副作用	骨髄抑制、脱毛、しびれ、関節痛・筋肉痛など																														
治験：サイラムザ +TAS102	サイラムザ	注	8	mg/kg	○														○													
	ロンサーフ	内服	70mg/m²	朝		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○															
				夕	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○																
	備考																															
	副作用	骨髄抑制、吐き気、下痢、インフュージョンリアクション、高血圧、尿蛋白、出血など																														
トラスツズマブ +PTX	トラスツズマブ	注	(初回)8 (以降)6	mg/kg mg/kg	○																											
	パクリタキセル	注	80	mg/m²	○							○							○													
	備考																															
	副作用	骨髄抑制、脱毛、しびれ、アレルギー、関節痛・筋肉痛など																														

投与間隔　：　35　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	・	・	・	34	35
TS-1 ＋CDDP （TS-1 3投2休）	エスワン	内服	80-120(mg)	朝		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
				夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
	シスプラチン	注	60　mg/m^2									○																			
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、腎機能障害、流涙など																													

無断転載禁止