

消化器外科 胃癌

投与間隔 : 14 日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール (日)																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
mFOLFOX6	オキサリプラチン	注	85 mg/m ²	○																
	レボホリナート	注	200 mg/m ²	○																
	フルオロウラシル (急速)	注	400 mg/m ²	○																
	フルオロウラシル (46時間持続)	注	2400 mg/m ²	○	→	→														
	備考																			
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、しびれ、アレルギーなど																		
Nivo+ mFOLFOX6	オプジーボ	注	240 mg	○																
	オキサリプラチン	注	85 mg/m ²																	
	レボホリナート	注	200 mg/m ²	○																
	フルオロウラシル (急速)	注	400 mg/m ²	○																
	フルオロウラシル (46時間持続)	注	2400 mg/m ²	○	→	→														
	備考																			
副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、しびれ、アレルギー、免疫関連有害事象など																			
オプジーボ (胃)	オプジーボ	注	240 mg	○																
	備考																			
	副作用	免疫関連有害事象																		
サイラムザ	サイラムザ	注	8 mg/kg	○																
	備考																			

	副作用	インフュージョンリアクション、高血圧、尿蛋白、出血など																						
CPT-11 Biweekly	イリノテカン	注	150 mg/m ²	○																				
	備考																							
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、口内炎など																						
サイラムザ +CPT-11 (臨床試験)	サイラムザ	注	8 mg/kg	○																				
	イリノテカン	注	150 mg/m ²	○																				
	備考																							
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、口内炎、インフュージョンリアクション、高血圧、尿蛋白、出血など																						

投与間隔 : 21 日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール (日)																					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
G-SOX	エスワン	内服	80-120(mg)	朝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
		夕			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
	オキサリプラチン	注	100 mg/m ²	○																					
	備考																								
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、口内炎、しびれ、アレルギー、流涙など																							
Nivo+SOX	オブジーボ	注	360 mg	○																					
	エスワン	内服	80-120(mg)	朝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
		夕			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
	オキサリプラチン	注	130 mg/m ²	○																					
	備考	高齢者など許容に難ある患者は100mg/m ²																							
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、口内炎、しびれ、アレルギー、流涙、免疫関連有害事象など																							
XELOX	カペシタビン	内服	1200- 2100(mg)/回	朝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
		夕			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
	オキサリプラチン	注	130 mg/m ²	○																					
	備考	カペシタビン : C法、適宜減量																							

	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、口内炎、しびれ、手足症候群、アレルギーなど																					
Nivo+XELOX	オプジーボ	注	360	mg	○																		
	カペシタビン	内服	1200- 2100(mg)/回	朝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	オキサリプラチン	注	130	mg/m ²	○																		
	備考	カペシタビン：C法、適宜減量																					
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、口内炎、しびれ、手足症候群、アレルギー、免疫関連有害事象など																					
トラスツズマブ +Xeloda +CDDP	トラスツズマブ	注	(初回)8 (以降)6	mg/kg	○																		
	カペシタビン	内服	1200- 2100(mg)/回	朝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	シスプラチン	注	80	mg/m ²	○																		
	備考	カペシタビン：C法、適宜減量																					
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、口内炎、手足症候群、腎・心機能障害など																					
トラスツズマブ +XELOX	トラスツズマブ	注	(初回)8 (以降)6	mg/kg	○																		
	カペシタビン	内服	1200- 2100(mg)/回	朝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	オキサリプラチン	注	130	mg/m ²	○																		
	備考	カペシタビン：C法、適宜減量																					
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、口内炎、しびれ、手足症候群、アレルギー心機能障害など																					
DTX Triweekly	ドセタキセル	注	60	mg/m ²	○																		
	備考																						
	副作用		骨髄抑制、味覚障害、脱毛、しびれ、アレルギー、倦怠感、筋肉痛・関節痛など																				
TS-1+DTX	エスワン	内服	80-120(mg)	朝 夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ドセタキセル	注	40	mg/m ²	○																		
	備考																						

PTX Weekly	パクリタキセル	注	80	mg/m ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	備考																			
	副作用	骨髄抑制、脱毛、しびれ、アレルギー、関節痛・筋肉痛など																		
サイラムザ +PTX	サイラムザ	注	8	mg/kg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	パクリタキセル	注	80	mg/m ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	備考																			
	副作用	骨髄抑制、脱毛、しびれ、過敏症・インフュージョンリアクション、関節痛・筋肉痛、高血圧、尿蛋白、出血など																		
サイラムザ +nabPTX	サイラムザ	注	8	mg/kg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	アブラキサン	注	100	mg/m ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	備考																			
	副作用	骨髄抑制、脱毛、しびれ、インフュージョンリアクション、関節痛・筋肉痛、高血圧、尿蛋白、出血など																		
5-FU (持続)	フルオロウラシル	注	800	mg/m ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	備考																			
	副作用	骨髄抑制など																		
nab-PTX Weekly	アブラキサン	注	100	mg/m ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	備考																			
	副作用	骨髄抑制、脱毛、しびれ、関節痛・筋肉痛など																		
治験：サイラムザ +TAS102	サイラムザ	注	8	mg/kg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ロンサーフ	内服	70mg/m ²	朝夕	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	備考																			
	副作用	骨髄抑制、吐き気、下痢、インフュージョンリアクション、高血圧、尿蛋白、出血など																		
トラスツズマブ +PTX	トラスツズマブ	注	(初回)8 (以降)6	mg/kg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	パクリタキセル	注	80	mg/m ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	備考																			
	副作用	骨髄抑制、脱毛、しびれ、アレルギー、関節痛・筋肉痛など																		

投与間隔 : 35 日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール (日)																																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	・	・	・	34	35					
<u>TS-1</u> <u>+CDDP</u> <u>(TS-1 3投2休)</u>	エスワン	内服	80-120(mg)	朝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
	シスプラチン	注	60 mg/m ²	夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
	備考																																			
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、腎機能障害、流涙など																																		

無断転載禁止