泌尿器科　精巣癌

投与間隔　：　21　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
カルボプラチン	カルボプラチン	注	7	AUC	○																													
	備考																																	
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感、アレルギーなど																																
BEP	ブレオ	注	30	mg		○							○							○														
	エトポシド	注	100	mg/m^2	○	○	○	○	○																									
	シスプラチン	注	20	mg/m^2	○	○	○	○	○																									
	備考																																	
	副作用	骨髄抑制、吐き気、口内炎、便秘、脱毛、倦怠感、腎障害、肺障害（間質性肺炎）など																																
TIP（精巣腫瘍）	パクリタキセル	注	210	mg/m^2	○																													
	イホマイド	注	1200	mg/m^2		○	○	○	○	○																								
	シスプラチン	注	20	mg/m^2		○	○	○	○	○																								
	備考																																	
	副作用	骨髄抑制、吐き気、口内炎、便秘、脱毛、倦怠感、しびれ、関節痛・筋肉痛、腎障害、排尿障害など																																

泌尿器科　陰茎癌

投与間隔　：　21　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
	パクリタキセル	注	175	mg/m^2	○																													
	イホマイド	注	1200	mg/m^2	○	○	○																											

| | | |