消化器外科　胆道癌

投与間隔　：　14　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
GEM+CDDP +TS-1(GCS)	ゲムシタビン	注	1000　mg/m^2	○
	シスプラチン	注	25　mg/m^2	○
	エスワン	注	80-120(mg)　朝	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
			80-120(mg)　夕	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	備考			
	副作用			骨髄抑制、吐き気、味覚異常、下痢、口内炎、腎機能障害、血管痛、流涙など

投与間隔　：　21　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
GEM+CDDP	ゲムシタビン	注	1000　mg/m^2	○ ○
	シスプラチン	注	25　mg/m^2	○ ○
	備考			
	副作用			骨髄抑制、吐き気、味覚異常、腎機能障害、血管痛など
イミフィンジ +GEM+CDDP	イミフィンジ	注	1500　mg	○
	ゲムシタビン	注	1000　mg/m^2	○ ○
	シスプラチン	注	25　mg/m^2	○ ○
	備考			最大８コース実施。以後はイミフィンジ維持療法へ移行。
	副作用			骨髄抑制、吐き気、味覚異常、腎機能障害、血管痛、免疫関連有害事象など
キイトルーダ	キイトルーダ	注	200　mg	○
	ゲムシタビン	注	1000　mg/m^2	○ ○

+GEM+CDDP	シスプラチン	注	25 mg/m^2	○							○																	
	備考	最大８コース実施。以後はキイトルーダ+GEMへ移行。																										
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚異常、腎機能障害、血管痛、免疫関連有害事象など																										

投与間隔　：　28　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）																								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
GEM	ゲムシタビン	注	1000 mg/m^2	○							○							○												
	備考																													
	副作用	骨髄抑制、血管痛など																												