



	副作用	インフュージョンリアクション、高血圧、尿蛋白、出血など																					
<b>CPT-11 Biweekly</b>	イリノテカン	注	150	mg/m <sup>2</sup>	○																		
	備考																						
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、口内炎など																					
<b>サイラムザ +CPT-11 (臨床試験)</b>	サイラムザ	注	8	mg/kg	○																		
	イリノテカン	注	150	mg/m <sup>2</sup>	○																		
	備考																						
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、口内炎、インフュージョンリアクション、高血圧、尿蛋白、出血など																					

**投与間隔 : 21 日**

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール (日)																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>G-SOX</b>	エスワン	内服	80-120(mg)	朝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
		夕			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
	オキサリプラチン	注	100	mg/m <sup>2</sup>	○																			
	備考																							
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、口内炎、しびれ、アレルギー、流涙など																						
<b>Nivo+SOX</b>	オブジーボ	注	360	mg	○																			
	エスワン	内服	80-120(mg)	朝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
		夕			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
	オキサリプラチン	注	130	mg/m <sup>2</sup>	○																			
	備考	高齢者など許容に難ある患者は100mg/m <sup>2</sup>																						
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、口内炎、しびれ、アレルギー、流涙、免疫関連有害事象など																						
<b>XELOX</b>	カペシタビン	内服	1200- 2100(mg)/回	朝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
		夕			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
	オキサリプラチン	注	130	mg/m <sup>2</sup>	○																			
	備考	カペシタビン：C法、適宜減量																						









