

+PEM	備考	6コースまで、その後維持療法へ									
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感、アレルギーなど									
CDDP +PEM	アリムタ	注	500	mg/m ²	○						
	シスプラチン	注	75	mg/m ²	○						
	備考	6コースまで、その後維持療法へ									
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、口内炎、倦怠感、腎機能障害など									
オプジーボ+ CDDP +PEM	オプジーボ	注	360	mg	○						
	ペメトレキセド	注	500	mg/m ²	○						
	シスプラチン	注	75	mg/m ²	○						
	備考	6コースまで、その後維持療法へ									
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、口内炎、倦怠感、腎機能障害、免疫関連有害事象など									
DTX Triweekly	ドセタキセル	注	60	mg/m ²	○						
	備考										
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、脱毛、倦怠感、浮腫など									
GEM	ゲムシタビン	注	1000	mg/m ²	○						
	備考										
	副作用	骨髄抑制、吐き気など									
PEM	アリムタ	注	500	mg/m ²	○						
	備考	維持療法としての使用もあり									
	副作用	骨髄抑制、吐き気など									
PTX +CBDCA (AUC6)	パクリタキセル	注	200	mg/m ²	○						
	カルボプラチン	注	6	AUC	○						
	備考	6コースまで									
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、脱毛、倦怠感、しびれ、関節痛・筋肉痛、アレルギーなど									
オプジーボ +PTX +CBDCA (AUC6)	オプジーボ	注	360	mg	○						
	パクリタキセル	注	200	mg/m ²	○						
	カルボプラチン	注	6	AUC	○						
	備考	6コースまで、その後維持療法へ									

<u>(AUC5)</u>	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、脱毛、倦怠感、しびれ、関節痛・筋肉痛、アレルギー、免疫関連有害事象など																			
PTX +CBDCA RT後 (AUC5)	パクリタキセル	注	200	mg/m ²	○																
	カルボプラチン	注	5	AUC	○																
	備考	化学放射線療法後の維持療法、2コース																			
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、脱毛、倦怠感、しびれ、関節痛・筋肉痛、アレルギーなど																			
nab-PTX +CBDCA	アブラキサン	注	100	mg/m ²	○					○											
	カルボプラチン	注	6	AUC	○																
	備考	6コースまで																			
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、脱毛、倦怠感、しびれ、関節痛・筋肉痛、アレルギーなど																			
VNR	ロゼウス	注	25	mg/m ²	○					○											
	備考																				
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、血管痛など																			
アバスチン (維持)	アバスチン	注	15	mg/kg	○																
	備考	維持療法																			
	副作用	高血圧、蛋白尿、出血など																			
アバスチン+ CBDCA +PEM	アバスチン	注	15	mg/kg	○																
	アリムタ	注	500	mg/m ²	○																
	カルボプラチン	注	5	AUC	○																
	備考	6コースまで、その後維持療法へ																			
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感、アレルギー、高血圧、蛋白尿、出血など																			
アバスチン +PEM (維持)	アバスチン	注	15	mg/kg	○																
	アリムタ	注	500	mg/m ²	○																
	備考	維持療法																			
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感、高血圧、蛋白尿、出血など																			
アバスチン +CBDCA +PTX	アバスチン	注	15	mg/kg	○																
	パクリタキセル	注	200	mg/m ²	○																
	カルボプラチン	注	6	AUC	○																
	備考	6コースまで、その後維持療法へ																			

+PEM (維持)	備考	維持療法									
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感、免疫関連有害事象など									
キイトルーダ+ PTX+CBDCA	キイトルーダ	注	200	mg	○						
	パクリタキセル	注	200	mg/m ²	○						
	カルボプラチン	注	6	AUC	○						
	備考	4コースまで、その後維持療法へ									
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、脱毛、しびれ、関節痛・筋肉痛、倦怠感、アレルギー、免疫関連有害事象など									
イジユド +イミフィンジ +PEM+CBDCA	イジユド	注	75	mg	○						
	イミフィンジ	注	1500	mg	○						
	ペメトレキセド	注	500	mg/m ²	○						
	カルボプラチン	注	5	AUC	○						
	備考	4コースまで、その後維持療法(イミフィンジ+イジユド+PEM 4週毎投与)へ維持のイジユドはtotal16週目のみ投与。									
副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感、アレルギー、免疫関連有害事象など										
イジユド +イミフィンジ +nabPTX +CBDCA	イジユド	注	75	mg	○						
	イミフィンジ	注	1500	mg	○						
	アブラキサン	注	100	mg/m ²	○		○			○	
	カルボプラチン	注	5	AUC	○						
	備考	4コースまで、その後維持療法(イミフィンジ+イジユド 4週毎投与)へ。維持のイジユドはtotal16週目のみ投与。									
副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、脱毛、しびれ、関節痛・筋肉痛、倦怠感、アレルギー、免疫関連有害事象など										
テセントリク +nab-PTX +CBDCA	テセントリク	注	1200	mg	○						
	アブラキサン	注	100	mg/m ²	○		○			○	
	カルボプラチン	注	6	AUC	○						
	備考										
副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、脱毛、しびれ、関節痛・筋肉痛、倦怠感、アレルギー、免疫関連有害事象など										
オプジーボ +CDDP +GEM	オプジーボ	注	360	mg	○						
	シスプラチン	注	75	mg/m ²	○						
	ゲムシタビン	注	1250	mg/m ²	○		○				
	備考										

