泌尿器科 尿路上皮がん

投与間隔　：　14　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
dd-MVAC	メソトレキセート	注	30　mg/m^2	○													
	エクザール	注	3　mg/m^2		○												
	ドキソルビシン	注	30　mg/m^2		○												
	シスプラチン	注	70　mg/m^2		○												
	備考																
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、脱毛、倦怠感、腎障害、心機能障害など															
バベンチオ	バベンチオ	注	10　mg/kg	○													
	備考																
	副作用	免疫関連有害事象、インフュージョンリアクション															
オプジーボ（2週毎）	オプジーボ	注	240　mg	○													
	備考																
	副作用	免疫関連有害事象															

投与間隔　：　21　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
GC	ゲムシタビン	注	1000　mg/m^2	○							○													
	シスプラチン	注	70　mg/m^2		○																			
	備考																							
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感、腎機能障害、血管痛など																						
	ゲムシタビン	注	1000　mg/m^2	○							○													

GC変法（CBDCA）	カルボプラチン	注	5	AUC		○			
	備考								
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感、アレルギー、血管痛など							
GDC	ゲムシタビン	注	750	mg/m^2	○		○		
	ドセタキセル	注	50	mg/m^2	○				
	カルボプラチン	注	5	AUC	○				
	備考								
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、脱毛、倦怠感、アレルギー、血管痛、浮腫など							
キイトルーダ（3週毎）	キイトルーダ	注	200	mg	○				
	備考								
	副作用	免疫関連有害事象							
パドセブ+キイトルーダ	パドセブ	注	1.25	mg/kg	○		○		
	キイトルーダ	注	200	mg	○				
	備考								
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感、しびれ、免疫関連有害事象など							
オプジーボ+GC	オプジーボ	注	360	mg	○				
	ゲムシタビン	注	1000	mg/m^2	○		○		
	シスプラチン	注	70	mg/m^2	○				
	備考								
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感、腎機能障害、血管痛、免疫関連有害事象など							
イミフィンジ+GEM+CDDP【術前】	イミフィンジ	注	1500	mg	○				
	ゲムシタビン	注	1000	mg/m^2	○		○		
	シスプラチン	注	70	mg/m^2	○				
	備考	最大4コース、40ml/min≦Ccr＜60ml/min：CDDP　35mg/㎡							
	副作用	骨髄抑制、吐き気、倦怠感、味覚異常、腎機能障害、血管痛、免疫関連有害事象など							

投与間隔　：　28　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）																										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
M-VAC	メソトレキセート	注	30 mg/m^2	○														○							○						
	エクザール	注	3 mg/m^2		○													○							○						
	ドキソルビシン	注	30 mg/m^2		○																										
	シスプラチン	注	70 mg/m^2		○																										
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、脱毛、倦怠感、腎機能障害、心機能障害など																													
パドセブ（患者限定）	パドセブ	注	1.25 mg/kg	○							○							○													
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感、しびれなど																													
ニボルマブ（6週毎）	ニボルマブ	注	480 mg	○																											
	備考																														
	副作用	免疫関連有害事象																													
イミフィンジ維持【術後】	イミフィンジ	注	1500 mg	○																											
	備考	全8コース																													
	副作用	免疫関連有害事象																													

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）																										
				1	・	・	・	8	・	・	・	15	・	・	・	22	・	・	・	・	29	・	・	・	・	35	・	・	・	・	42
キイトルーダ（6週毎）	キイトルーダ	注	400 mg	○																										
	備考																													
	副作用	免疫関連有害事象																												