

	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、口内炎、しびれ、アレルギー、流涙など																					
XELOX	カペシタビン	内服	1200- 2100(mg)/回	朝 夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	オキサリプラチン	注	130 mg/m ²		○																		
	備考	カペシタビン：C法、適宜減量																					
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、口内炎、しびれ、手足症候群、アレルギーなど																					
アービタックス +SOX	アービタックス	注	(初回)400mg/m ² (以降)250mg/m ²		○																		
	エスワン	内服	80-120(mg)	朝 夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	オキサリプラチン	注	130 mg/m ²		○																		
	備考																						
副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、口内炎、しびれ、皮膚障害、インフュージョンリアクション、低Mg血症、流涙など																						
アービタックス +XELOX	アービタックス	注	(初回)400mg/m ² (以降)250mg/m ²		○																		
	カペシタビン	内服	1200- 2100(mg)/回	朝 夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	オキサリプラチン	注	130 mg/m ²		○																		
	備考	カペシタビン：C法、適宜減量																					
副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、口内炎、しびれ、皮膚障害、手足症候群、過敏症・インフュージョンリアクション、低Mg血症など																						
アバスチン +IRIS	アバスチン	注	7.5 mg/kg		○																		
	エスワン	内服	80-120(mg)	朝 夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	イリノテカン	注	150 mg/m ²		○																		
	備考																						
副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、脱毛、口内炎、皮膚障害、高血圧、尿蛋白、出血、流涙など																						

