





	副作用	骨髄抑制、しびれ、心機能障害など									
<b>パージェタ +トラスツズマブ +DTX</b>	パージェタ	注	(初回) 840 mg (以降) 420 mg	○							
	トラスツズマブ	注	(初回)8 mg/kg (以降)6 mg/kg	○							
	ドセタキセル	注	75 mg/m <sup>2</sup>	○							
	備考										
	副作用	骨髄抑制、味覚障害、脱毛、しびれ、アレルギー、心機能障害、倦怠感、関節痛・筋肉痛など									
<b>パージェタ +トラスツズマブ +PTX</b>	パージェタ	注	(初回) 840 mg (以降) 420 mg	○							
	トラスツズマブ	注	(初回)8 mg/kg (以降)6 mg/kg	○							
	パクリタキセル	注	80 mg/m <sup>2</sup>	○		○		○			
	備考										
	副作用	骨髄抑制、味覚障害、脱毛、しびれ、アレルギー、心機能障害、倦怠感、関節痛・筋肉痛など									
<b>パージェタ +トラスツズマブ +ハラヴェン</b>	パージェタ	注	(初回) 840 mg (以降) 420 mg	○							
	トラスツズマブ	注	(初回)8 mg/kg (以降)6 mg/kg	○							
	ハラヴェン	注	1.4 mg/m <sup>2</sup>	○		○					
	備考										
	副作用	骨髄抑制、脱毛、心機能障害など									
<b>トラスツズマブ</b>	トラスツズマブ	注	(初回)8 mg/kg (以降)6 mg/kg	○							
	備考										
	副作用	心機能障害など									
<b>トラスツズマブ</b>	トラスツズマブ	注	(初回)8 mg/kg (以降)6 mg/kg	○							



<b>エンハーツ</b>	備考										
	副作用	骨髄抑制、吐き気、アレルギー、心機能障害、間質性肺炎など									
<b>PMB (3週毎) +GEM +CBDCA</b>	キイトルーダ	注	200	mg	○						
	ゲムシタビン	注	1000	mg/m <sup>2</sup>	○		○				
	カルボプラチン	注	2	AUC	○		○				
	備考										
	副作用	骨髄抑制、吐き気、脱毛、アレルギー、血管痛、免疫関連有害事象など									
<b>TCHP</b>	パージェタ	注	(初回) 840 (以降) 420	mg	○						
	トラスツズマブ	注	(初回)8 (以降)6	mg/kg	○						
	ドセタキセル	注	75	mg/m <sup>2</sup>	○						
	カルボプラチン	注	6	AUC	○						
	備考										
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、脱毛、しびれ、アレルギー、心機能障害、倦怠感、関節痛・筋肉痛など									
<b>PMB (3週毎) +PTX +CBDCA</b>	キイトルーダ	注	200	mg	○						
	パクリタキセル	注	80	mg/m <sup>2</sup>	○		○		○		
	カルボプラチン	注	1.5	AUC	○		○		○		
	備考										
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、脱毛、しびれ、アレルギー、倦怠感、関節痛・筋肉痛、免疫関連有害事象など									
<b>PMB (3週毎) +AC</b>	キイトルーダ	注	200	mg	○						
	ドキシソルビシン	注	60	mg/m <sup>2</sup>	○						
	エンドキサン	注	600	mg/m <sup>2</sup>	○						
	備考										
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、脱毛、心機能障害、倦怠感、免疫関連有害事象など									
<b>PMB (3週毎) +FC</b>	キイトルーダ	注	200	mg	○						
	エピルビシン	注	90	mg/m <sup>2</sup>	○						
	エンドキサン	注	600	mg/m <sup>2</sup>	○						





